

USG JAMY BRZUSZNEJ, UKŁADU MOCZOWEGO

1. Na 2-3 dni przed badaniem należy zażyć Ulgasin 240 mg –1 kapsułkę wieczorem (Ulgasin dostępny w aptece bez recepty).
2. Przed badaniem 6 godzin bez jedzenia, nie wskazane jest picie alkoholu, kawy, napojów gazowanych, palenie papierosów. Można pić płyny niegazowane.
3. W przeddzień badania dieta lekkostrawna.
4. Podobnie należy przygotować się do badania USG: naczyń nerkowych, żyły wrotnej, aorty, ginekologicznego przez powłoki brzuszne.
5. Na 2 godziny przed badaniem wypić, co najmniej, 1-1,5 litra przegotowanej / mineralnej wody.
6. Na 30 minut przed badaniem nie można opróżniać pęcherza!

W razie przewlekłych wzdęć Espumisan / Raphacholin 3 x 1-2 tabletki przez 3 dni przed badaniem.

PONIEWAŻ BADANIA RTG/USG SĄ BADANIAMI PORÓWNAWCZYMI BARDZO WSKAZANE JEST WZIĘCIE ZE SOBĄ NA WIZYTĘ U LEKARZA POPRZEDNICH BADAŃ/KLISZ RTG. JEST TO BARDZO POMOCNE PRZY OCENIE DYNAMIKI EWENTUALNYCH ZMIAN.